

01;05

## **Спиновые стекла во внешнем случайном магнитном поле**

© А.Н. Морозов, А.В. Скрипкин

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана  
E-mail: skripkin@bmstu.ru*Поступило в Редакцию 14 января 2015 г.*

Рассматривается спиновое стекло, помещенное во внешнее, случайно меняющееся магнитное поле. Считается, что магнитная релаксация спинового стекла имеет степенной характер. Показано, что изменение намагниченности стекла представляет собой в этом случае немарковский процесс. Найдены статистические характеристики флуктуаций намагниченности.

Процессы релаксации в физических и технических системах, как правило, имеют экспоненциальный характер. В этом случае для описания их поведения могут с успехом применяться соответствующие дифференциальные уравнения, теория которых хорошо разработана [1]. Случайные процессы, происходящие в таких системах, будут относиться к классу марковских процессов. Однако многие релаксационные процессы имеют более медленный, степенной характер. К ним относят, в частности, интенсивность излучения остывающего тела [2, 3], люминесценцию беккерелевского типа [4] и т.д. Случайные процессы в таких системах будут относиться в общем случае к классу немарковских процессов. Заметим, что немарковский характер явлений проявляется при учете увлечения броуновской частицей окружающих частиц среды [5], диффузии [6] и многих других процессов.

В предлагаемой работе рассматривается спиновое стекло, помещенное во внешнее случайное магнитное поле. При этом намагниченность

стекла спадает по степенному закону, что имеет место для многих его видов, например: сплава золота и железа [7], сплава  $Zn_xCd_{1-x}Cr_2Se_4$  [8], некоторых типов сульфошпинелей железа [9] и т. д.

Пусть спиновое стекло помещено в постоянное магнитное поле и в момент времени  $\tau$  его намагниченность равна  $M_0(\tau)$ . Если в этот момент времени выключить внешнее поле, то магнитная релаксация спинового стекла будет описываться степенным законом вида

$$M(t) = \frac{M_0(\tau)}{[1 + \beta(t - \tau)]^\alpha}, \quad t > \tau, \quad (1)$$

где  $\alpha$  — параметр, характеризующий релаксационные свойства материала и слабо зависящий от напряженности магнитного поля (в частности, для сплава  $Zn_xCd_{1-x}Cr_2Se_4$  в широком интервале значений поля  $\alpha \approx 0.1$ ),  $\beta$  — параметр, имеющий смысл обратного времени релаксации (для рассматриваемого сплава он составляет величину порядка единицы).

Будем считать, что внешнее поле  $H(t)$  и намагниченность стекла  $M_0(t)$  пропорциональны:  $M_0(t) = \chi H(t)$ ,  $\chi$  — магнитная восприимчивость. Кратковременное внешнее воздействие на спиновое стекло на интервале времени  $(\tau; \tau + d\tau)$  приведет к последующему изменению его намагниченности согласно выражению


$$dM(t) = \chi \frac{d}{d\tau} \frac{H(\tau)}{[1 + \beta(t - \tau)]^\alpha} d\tau. \quad (2)$$

При произвольном внешнем магнитном воздействии  $H(t)$  получим

$$M(t) = \alpha\beta\chi \int_0^t \frac{H(\tau)}{[1 + \beta(t - \tau)]^{\alpha+1}} d\tau. \quad (3)$$

В выражении (3) предполагается, что в момент времени  $t = 0$  внешнее поле и намагниченность спинового стекла отсутствовали.

Полученное уравнение (3) показывает, что наличие случайного внешнего магнитного воздействия приводит к стохастическому интегральному уравнению для описания намагниченности спинового стекла. Так как в общем случае выражение (3) несводимо к конечной системе стохастических дифференциальных уравнений, то процесс  $M(t)$  будет являться немарковским случайным процессом [10].



**Рис. 1.** Графики дисперсии намагниченности  $\langle M^2(t) \rangle$ , задаваемые выражением (6), при  $\alpha = 0.1$  (1), 0.15 (2), 0.2 (3).

Будем далее считать, что внешнее поле  $H(t)$  представляет собой белый шум с нулевым математическим ожиданием и интенсивностью  $\nu$ . Для получения статистических характеристик процесса  $M(t)$  воспользуемся методом описания немарковских процессов, задаваемых линейными интегральными преобразованиями [11]. Для одномерной характеристической функции  $g_1(\lambda, t)$  процесса  $M(t)$  получим

$$g_1(\lambda, t) = \exp \left[ -\frac{1}{2} \frac{\nu \lambda^2 \alpha^2 \beta \chi^2}{2\alpha + 1} (1 - (1 + \beta t)^{-2\alpha-1}) \right], \quad (4)$$


откуда для среднего значения  $\langle M(t) \rangle$  и дисперсии  $\langle M^2(t) \rangle$  находим соотношения

$$\langle M(t) \rangle = \frac{\partial g_1(\lambda, t)}{i \partial \lambda} \Big|_{\lambda=0} = 0, \quad (5)$$

$$\langle M^2(t) \rangle = -\frac{\partial^2 g_1(\lambda, t)}{\partial^2 \lambda} \Big|_{\lambda=0} = \frac{\nu \alpha^2 \beta \chi^2}{2\alpha + 1} (1 - (1 + \beta t)^{-2\alpha-1}). \quad (6)$$

Из последнего выражения видно, что для реальных спиновых стекол дисперсия флуктуаций намагниченности стремится с течением времени

1\* Письма в ЖТФ, 2015, том 41, вып. 13



**Рис. 2.** Графики плотности распределения  $p(M, t)$ , задаваемые выражением (8), при  $\alpha = 0.1$  и  $t = 0.2$  s (1),  $t = 1.0$  s (2),  $t = \infty$  (3).

к постоянной величине


$$\langle M^2(t) \rangle|_{t \rightarrow \infty} = \frac{\nu \alpha^2 \beta \chi^2}{2\alpha + 1}. \quad (7)$$

Графики, задаваемые выражением (6), для различных значений параметра  $\alpha$  изображены на рис. 1. Здесь и в дальнейшем будем считать  $\chi = 1$ ,  $\beta = 1 \text{ s}^{-1}$ ,  $\nu = 1 \text{ A}^2 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}$ .

Для плотности распределения величины  $M(t)$  находим соотношение

$$\begin{aligned} p(M, t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g_1(\lambda, t) \exp(-i\lambda M) d\lambda \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi \langle M^2(t) \rangle}} \exp\left(-\frac{M^2}{2 \langle M^2(t) \rangle}\right). \end{aligned} \quad (8)$$

График зависимости (8) для разных значений времени  $t$  приведен на рис. 2. Видно, что он представляет собой в каждый момент времени гауссову кривую, „размазывающуюся“ с течением времени вдоль оси  $M$ ,



**Рис. 3.** Графики спектральной плотности  $G_M(\omega)$  флуктуаций намагниченности, задаваемые выражением (10), при  $\alpha = 0.1$  (1),  $\alpha = 0.2$  (2),  $\alpha = 0.5$  (3).

и стремится к стационарной кривой при  $t \rightarrow \infty$ , соответствующей установившемуся процессу флуктуаций намагниченности стекла.

Спектральная плотность мощности установившихся флуктуаций намагниченности стекла  $G_M(\omega)$  может быть получена из выражения (3). Находим

$$G_M(\omega) = \alpha^2 \chi^2 \left( \frac{\omega}{\beta} \right)^{-\alpha-1} \Gamma^2 \left( 1 - \alpha, \frac{\omega}{\beta} \right) \nu, \quad (9)$$

где  $\Gamma(x, y)$  — дополнительная неполная гамма-функция, определяемая при помощи формулы [12]

$$\Gamma(x, y) = \int_y^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt. \quad (10)$$

Графики спектральной плотности  $G_M(\omega)$  флуктуаций намагниченности стекла  $M(t)$  в зависимости от частоты  $\omega$  при различных значениях параметра  $\alpha$  изображены на рис. 3. Отметим, что спектральная плотность  $G_M(\omega)$  относится к одному из типов цветных шумов (в частности, при малых  $\alpha$  соответствует так называемому фликкер-шуму).

Рассмотренная в работе модель изменения намагниченности спинового стекла со степенной релаксацией, помещенного во внешнее флуктуирующее магнитное поле, иллюстрирует, что отклик реальных физических систем даже на марковское внешнее воздействие представляет собой в общем случае немарковский процесс и, следовательно, требует для своего описания математические методы, способные учитывать эргодичность таких процессов, в частности метод интегральных стохастических операторов. Марковское описание данных явлений представляет собой лишь первое приближение.

## Список литературы

- [1] Пугачев В.С., Сеницын И.Н. Стохастические дифференциальные системы. М.: Наука, 1990. 642 с.
- [2] Морозов А.Н., Скрипкин А.В. // Прикладная физика. 2011. № 3. С. 25.
- [3] Морозов А.Н., Скрипкин А.В. // Нелинейный мир. 2014. Т. 12. С. 14.
- [4] Морозов А.Н., Скрипкин А.В. // Нелинейный мир. 2010. Т. 8. С. 545.
- [5] Morozov A.N., Skripkin A.V. // Physics Letters. A. 2011. V. 375. P. 4113.
- [6] Морозов А.Н., Скрипкин А.В. // Известия вузов. Физика. 2010. Т. 53. № 11. С. 55.
- [7] Holtzberg F., Tholence J.L., Tournier R. Amorphous Magnetism II. N.Y.: Plenum Press, 1977. P. 155.
- [8] Веселаго В.Г., Минаков А.А., Мягков А.В. // Письма в ЖЭТФ. 1983. Т. 38. С. 255.
- [9] Абрамович А.И., Королева Л.И., Лукина Л.Н. // ФТТ. 1999. Т. 41. С. 84.
- [10] Морозов А.Н. Необратимые процессы и броуновское движение. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1997. 332 с.
- [11] Морозов А.Н. // Вестник МГТУ. Естественные науки. 2004. № 3. С. 47.
- [12] Никифоров А.Ф., Уваров В.Б. Специальные функции математической физики. М.: Наука, 1984. 344 с.